





Sommaire

$Module\ 1-Contexte\ epidemiologique,\ politique\ et\ strategique\ autour\ de\ l'integration\ de\ l'ADVII$	Н 3
Fiche pratique n°1.1 : contexte international du VIH	4
Fiche pratique n°1.2 : intégration de l'ADVIH comme nouvelle stratégie de dépistage	5
Fiche pratique n°1.3 : données épidémiologiques	6
Fiche pratique n°1.4 : cadre légal, politique et stratégie nationale du VIH et intégration de l'ADVIH – Cô d'Ivoire Erreur ! Signet non d	
Fiche pratique n°1.4 : cadre légal, politique et stratégie nationale du VIH et intégration de l'ADVIH – Mali Erreur ! Signet non d	éfini.
Fiche pratique n°1.4 : cadre légal, politique et stratégie nationale du VIH et intégration de l'ADVIH – Sénégal	7
Fiche pratique n°1.5 : le projet ATLAS	8
Fiche pratique n°1.6 : populations ciblées par le projet ATLAS	9
Fiche pratique n°1.7 : explication des canaux de distribution	10
Fiche pratique n°1.8 : explication des canaux de distribution (jeunes) Erreur ! Signet non d	éfini.
MODULE 2 — PRESENTATION DE L'ADVIH ORALORAQUICK© ET DES SUPPORTS POUR SA DISPENSATION	11
Fiche pratique n°2.1 : les 5 « C »	12
Fiche pratique n°2.2 : stratégie de dépistage de l'ADVIH et modalités de dispensation	12
Fiche pratique n°2.3 : information, soutien et orientation des usagères et usagers Erreur ! Signet non d	éfini.
Fiche pratique n°2.4 : supports pour la dispensation et la réalisation de l'ADVIH	éfini.
Fiche pratique n°2.5 : scénario d'interprétation des résultats	16
Fiche pratique n°2.6 : erreurs observées lors de la réalisation de l'ADVIH Erreur ! Signet non d	éfini.
Fiche pratique n°2.7 : questions/réponses fréquentes	18
Fiche pratique n°2.8 : messages clés	20
Module 3 – Le role, les qualites attendues des professionnels de sante et la dispensation de l'auto de depistage du VIH dans le projet ATLAS	TEST 21
Fiche pratique n°3.1 : discrimination et stigmatisation à l'égard des PVVIH	22
Fiche pratique n°3.2 : lien entre conseil et dispensation de l'ADVIH du projet ATLAS Erreur ! Signe défini.	t non
Fiche pratique n°3.3 : la posture d'écoute active et de conseil	24
Fiche pratique n°3.4 : les spécificités de la dispensation dans le cadre du projet ATLAS	25
Fiche pratique n°3.5 : définitions de la notification	27
Fiche pratique n°3.6 : objectifs et cadre de la notification aux partenaires dans le projet ATLAS	28
Fiche pratique n°3.7 : les modalités de dispensation ATLAS dans la pratique	30
Fiche pratique n°3.8 : importance et défis du lien vers la confirmation et l'entrée dans les soins	31
Fiche pratique n°3.9 : principes et objectifs du suivi et évaluation du projet ATLAS	31
Fiche pratique n°3.10 : outils de suivi et évaluation	33





MODULE 1 – CONTEXTE EPIDEMIOLOGIQUE, POLITIQUE ET STRATEGIQUE AUTOUR DE L'INTEGRATION DE L'ADVIH



FICHE PRATIQUE N°1.1: CONTEXTE INTERNATIONAL DU VIH

En Décembre 2013, le Conseil de Coordination du Programme de l'ONUSIDA à invité l'ONU/SIDA à soutenir les efforts des pays et des régions pour déterminer de nouvelles cibles pour le passage à échelle du traitement du VIH au-delà de 2015.

- A l'horizon 2020, 90% des personnes vivant avec le VIH connaissent leur statut sérologique (il s'agit du 1^{er} 90);
- A l'horizon 2020, 90% de toutes les personnes infectées par le VIH dépistées reçoivent un traitement anti rétroviral durable (il s'agit du 2^{eme} 90);
- A l'horizon 2020, 90% des personnes recevant un traitement antirétroviral ont une charge virale durablement supprimée (il s'agit du 3^{eme} 90).

Pour cela, il est essentiel que :

- Chaque personne connaisse son statut sérologique au regard du VIH, <u>ainsi que celui de son</u> <u>partenaire</u>;
- Qu'à l'issue du diagnostic, ils aient recours aux services de prévention, de traitement et de soins de l'infection à VIH.
- Que le traitement soit suivi rigoureusement.

Au cours des quinze dernières années, les efforts de dépistage du VIH se sont considérablement intensifiés à l'échelle mondiale.

- Plus de deux tiers de l'ensemble des personnes vivant avec le VIH environ 70% [51–84%] connaissaient leur statut sérologique en 2016
- Cela a été en grande partie possible grâce à l'utilisation généralisée de traitements efficaces contre l'infection à VIH et à la large disponibilité de tests de diagnostic rapide (TDR) peu coûteux
- La disponibilité et l'utilisation accrues des TDR ont favorisé le partage des tâches, permettant au dépistage d'être effectué par des prestataires de soins non professionnels et d'être mis en œuvre dans un plus grand nombre de contextes

Malgré ces progrès, des lacunes importantes persistent !

- En 2017, moins de la moitié 48 % [31–68 %] des personnes vivant avec le VIH en Afrique de l'Ouest et du Centre connaissaient leur statut VIH
- Nombre de personnes à haut risque d'infection, notamment les partenaires de personnes vivant avec le VIH et les populations clés à l'échelle mondiale, ne sont pas couvertes par les services de dépistage

L'autotest de dépistage du VIH est un outil innovant qui favorise l'autonomisation du patient, permet de diagnostiquer davantage de personnes VIH-positives et aide à <u>atteindre la première des cibles</u> 90 90 90 !

- Etendre l'utilisation de l'ADVIH contribue à encourager ceux qui se font dépister pour la première fois, les personnes VIH positives non diagnostiquées et les sujets constamment exposés au risque (qui doivent se faire dépister régulièrement)
- L'ADVIH est une approche supplémentaire aux services de dépistage du VIH
- Cette stratégie a d'ores et déjà été expérimenté/introduit dans de nombreux pays notamment en Afrique Australe (programme STAR financé par UNITAID)



FICHE PRATIQUE N° 1.2: INTEGRATION DE L'ADVIH COMME NOUVELLE STRATEGIE DE DEPISTAGE

Les avantages de l'autotest sont :

- Rapide : donne le résultat en 20 minutes
- Pratique : pas besoin de se déplacer en centre de santé
- Favorise l'autonomisation (empowerment) des personnes
- **Discrétion :** réduit la peur de la stigmatisation
- Forte acceptabilité (population générale et populations-clés)
- · Efficace et fiable
- Crée la demande pour le dépistage VIH chez les populations sans accès aux services actuels
- Ne démontre pas de conséquences sociales et comportementales négatives (violences, suicide, comportements à risque)

L'ADVIH complète les offres de dépistage classique :

- Il permet de ce fait d'atteindre des populations qui jusque-là n'avaient pas accès au dépistage
- Il favorise la discrétion et bénéficie d'une forte acceptabilité, notamment auprès des populations clés
- L'autotest de dépistage du VIH représente un pas en avant pour accroître l'autonomie des personnes, décentraliser les services et créer la demande pour le dépistage du VIH
- L'ADVIH peut donner des résultats aussi fiables que lorsqu'il est utilisé par un prestataire formé
- Les démonstrations en personne et la mise à disposition d'autres moyens d'information, comme des vidéos, peuvent également contribuer à une meilleure performance des autotests du VIH

Par ailleurs, les expériences montrent que l'ADVIH :

- Multiplie par plus de 2 le recours au dépistage du VIH chez les hommes qui ont des rapports sexuels avec des hommes et chez les partenaires de sexe masculin des femmes enceintes ou venant d'accoucher
- Augmente le recours au dépistage du VIH chez les couples, notamment chez les partenaires de sexe masculin des femmes enceintes ou des femmes en post partum
- Double pratiquement la fréquence du dépistage du VIH chez les hommes qui ont des rapports sexuels avec des hommes
- Peut identifier un pourcentage équivalent ou supérieur de personnes VIH positives
- Ne renforce pas les comportements à risque (comme les rapports anaux sans préservatif) ni le nombre d'infections sexuellement transmissibles (IST) bactériennes
- Ne réduit pas le recours ou la fréquence de dépistage des IST.
- N'accroît pas les conséquences sociales négatives, ni les événements ou comportements indésirables
- Donne d'aussi bons résultats qu'un TDR du VIH utilisé et interprété par un travailleur de la santé qualifié

En quoi l'autotest réduit les barrières d'accès au dépistage?

- Temps
- Volonté de discrétion
- Stigmatisation et discrimination
- Transport (coût et disponibilité)
- Attitudes du personnel de santé
- · Peur de connaitre son statut
- Déni
- Annonce aux proches
- Accessibilité
- Confidentialité



- Temps
- Volonté de discrétion
- Stigmatisation et discrimination
- Transport (coût et disponibilité)
- Attitudes du personnel de santé
- · Peur de connaître son statut
- Déni
- · Annonce aux proches
- Accessibilité
- Confidentialité



FICHE PRATIQUE N°1.3: DONNEES EPIDEMIOLOGIQUES

Dans la région d'Afrique de l'Ouest ...

- Nous sommes face à une épidémie modérée avec une prévalence inférieure à 5%
- La prévalence moyenne est de 1.9%
- Nous sommes face à une épidémie concentrée notamment parmi les populations clés dont les prévalences sont élevées

Les prévalences dans la région et au Sénégal ...

• Afrique de l'Ouest : 1.9%

• **Sénégal**: 0.4%

Le nombre de PVVIH estimé en Afrique de l'Ouest et du Centre et dans chacun de ces pays ...

• En Afrique de l'Ouest et du Centre : 6.1 millions de personnes

• **Sénégal**: 40 000 personnes

Le niveau du 1^{er} 90

• Dans le monde : 70%

• En Afrique de l'Ouest et du Centre : 48%

• Au Sénégal: 71% avec un second 90 à 76%



FICHE PRATIQUE N° 1.4: CADRE LEGAL, POLITIQUE ET STRATEGIE NATIONALE DU VIH ET INTEGRATION DE L'ADVIH – SENEGAL

Points clés:

- Pénalisation des rapports contre nature mais pas du travail du sexe
- · La loi VIH pose un cadre légal facilitant l'accès au dépistage gratuit, anonyme et volontaire
- La loi VIH réglemente la notification aux partenaires obligeant toute PVVIH à annoncer son statut à son conjoint/partenaires sexuels. Les prestataires de santé doivent accompagner ce processus de notification
- Peines encourues pour la discrimination des PVVIH, la transmission du VIH, le non-respect de la confidentialité sans accord de la PVVIH
- Les stratégies VIH, politiques normes et procédures du dépistage VIH intègrent d'ores et déjà l'utilisation de l'ADVIH avec une première expérience dans le pays créant un environnement très favorable au déploiement de l'ADVIH dans le pays

Population clés

- Loi pénalisant les rapports sexuels des hommes avec les hommes.
- · Pas de loi pénalisant le travail du sexe mais travail encadré entrainant des risques de sanctions

Dépistage

- · Volontaire, gratuit et anonyme
- Consentement préalable, libre et éclairé. Toute personne âgée d'au moins 15 ans a le droit de se faire dépister seule pour le VIH

Notification

- Les services de prise en charge doivent apporter tout l'appui psychosocial nécessaire pour soutenir et aider la personne infectée par le VIH à en faire l'annonce
- Au cas où la personne ne peut/veut pas faire personnellement l'annonce, le médecin ou toute autre personne qualifiée, en accord ou non avec la personne infectée, peut faire l'annonce sans violer les dispositions relatives à la confidentialité
- Dans tous les cas, le ou les conjoint(e)s ou partenaires(s) sexuel(le)s informé(s) du statut sérologique positif, seront incités à subir le test de dépistage

Dispositions pénales

- Toute personne coupable des actes discriminatoires envers les PVVIH sera punie
- Toute personne qui, connaissant son statut sérologique positif et les modes de transmission du VIH, entreprend des rapports sexuels non protégés avec l'intention de transmettre à une autre personne
- Toute personne qui, hors les cas où la loi l'oblige, aura révélé l'état sérologique d'une personne infectée par le VIH

Environnement très favorable à l'introduction de l'autotest :

- ADVIH présent dans le Plan stratégique national de lutte contre le SIDA 2018-2022
- ADVIH et notification intégrée dans les politiques, normes et protocoles des services de dépistage du VIH y compris dans les algorithmes de dépistage et confirmation
- Dépistage communautaire existant et mis en œuvre par de nombreux acteurs
- Volonté de développer en 2019 une stratégie nationale spécifique à l'ADVIH
- Intégration de plus de 40 000 autotests de dépistage du VIH dans la demande de fonds catalytique au Fonds mondial
- Groupe de travail national autour de l'ADVIH
- · Première expérience pilote menée par ENDA Santé/John Hopkins University



FICHE PRATIQUE N°1.5: LE PROJET ATLAS

Le projet ATLAS en bref

- 3 pays d'Afrique de l'Ouest : Côte d'Ivoire, Mali et Sénégal
- Un projet de **mise en œuvre à échelle moyenne** (et non un projet pilote) avec un important volet recherche et évaluation afin de renseigner les futurs choix politiques et stratégiques dans la région
- Populations ciblées par le projet :
 - Populations-clés difficiles à atteindre et leurs partenaires: hommes ayant des relations sexuelles avec des hommes (HSH) y compris « cachés », travailleuses du sexe (TS) y compris occasionnelles et leurs partenaires et clients, usagères et usagers de drogues (UD) et leurs partenaires
 - o Partenaires de PVVIH
 - o Patients IST et leurs partenaires
 - Jeunes de 16-24 ans (en Côte d'Ivoire uniquement)
- Distribution d'environ 500 000 autotests
- Durée: **3,5 ans** (juin 2018-novembre 2021)

Les grands axes d'intervention du projet ATLAS

Conditions favorables à l'introduction et au passage à grande échelle de l'ADVIH

- Appui aux autorités nationales pour l'intégration de l'ADVIH dans les stratégies nationales
- Développement de matériel support pour accompagner l'usagère et l'usager pour la réalisation de l'ADVIH, l'interprétation des résultats et le lien vers les services adaptés

Mettre en place des modèles de dispensation ciblant les populations clés et groupes vulnérables

- Développement des modules de formation et renforcement des capacités des acteurs
- Développement des approches et stratégies/canaux de dispensation dans chaque pays

Générer et partager les preuves de l'impact et des résultats de la mise en œuvre

- Dispositif M&E permettant de suivre performance et efficacité/impact de la distribution
- 3 grands volets de recherche :
 - Qualitatif sur facteurs et impact sociaux (Partenaires PVVIH et populations clés
 - Etude auprès des usagères et usagers de l'ADVIH notamment sur acceptabilité, facilité de réalisation et lien vers dépistage de confirmation/soins
 - Etudes sur les coûts et évaluation d'impacts et mesures du coût-efficacité de l'ADVIH dans chaque pays

Les impacts attendus et objectifs du projet ATLAS

- Impact Attendu : Réduction de la morbidité et de la mortalité dues au VIH / SIDA
- Objectif Général : Améliorer l'accès à l'ADVIH et assurer un lien efficace avec la prise en charge
- **OS 1 :** Mettre en place des conditions favorables à l'introduction et au passage à grande échelle de l'ADVIH et susciter la demande nécessaire d'autotests parmi les populations cibles
- OS 2 : Mettre en place des modèles de dispensation ciblant les populations clés et groupes vulnérables, faire le lien avec les soins et complémenter les autres modes de dépistage
- OS 3 : Générer et partager les preuves de l'impact et des résultats de la mise en œuvre des différents modèles de mise à disposition avec les acteurs nationaux, régionaux et internationaux



FICHE PRATIQUE N° 1.6: POPULATIONS CIBLEES PAR LE PROJET ATLAS

Les populations clés difficiles à atteindre

- L'accès au service de dépistage est insuffisant pour une large proportion des populations clés à savoir :
 - o Les HSH.
 - Les travailleuses du sexe
 - Les usagères et usagers de drogues
- ... et ce, alors même que les prévalences VIH parmi ces populations sont importantes.
- Il reste donc un **nombre significatif de personnes vivant avec le VIH** parmi ces populations qui :
 - Ne connaissent pas leur statut,
 - Ne se soignent pas
 - Et risquent ainsi de contaminer d'autres personnes.

Parmi ces populations, certaines sont ainsi plus difficile à atteindre car :

- Elles ne fréquentent pas les services de santé notamment du fait de leur stigmatisation/discrimination
- Elles ne fréquentent pas les associations de leur communauté
- Elles ne se reconnaissent pas elle-même comme faisant partie des populations clés (exemple : travailleuses du sexe occasionnelles, hommes mariés et ayant des relations sexuelles avec les hommes)
- Elles ne se reconnaissent pas à risque d'avoir le VIH

<u>Ces populations clés difficiles à atteindre et leurs partenaires</u> sont une cible prioritaire pour le projet ATLAS.


De plus d'autres populations sont des cibles prioritaires du projet ATLAS car elles présentent un risque d'infection à VIH plus important que la population générale à savoir :

- Les clients des travailleuses du sexe qui jouent un rôle important dans la dynamique de l'épidémie VIH dans la sous-région
- Les partenaires des PVVIH qui sont à risque significatif d'être séropositifs du fait du statut de leur partenaire
- Les personnes diagnostiquées avec une infection sexuellement transmissible et leur partenaire du fait du risque plus élevé d'avoir le VIH (pour rappel le dépistage VIH est une indication médicale en cas d'infection sexuellement transmissible)
- Les jeunes entre 16 et 24 ans ayant des comportements à risque et leur partenaire (uniquement en RCI pour le projet ATLAS)



FICHE PRATIQUE N°1.7: EXPLICATION DES CANAUX DE DISTRIBUTION


1. Dépistage des Cas Index : Distribution secondaire pour les partenaires des PVVIH



A travers les consultations PVVIH (<u>stratégie fixe /point d'entrée</u>), l'objectif est que le professionnel de santé (<u>dispensateur</u>) accompagne la PVVIH (<u>distribution primaire</u>) à dévoiler son statut à son/sa/ses partenaire.s (<u>distribution secondaire</u>) afin qu'il/elle se dépiste en proposant notamment l'autotest.

La PVVIH n'est pas bénéficiaire de l'autotest


2. Dépistage dans les consultations IST : distribution secondaire pour les partenaires des personnes diagnostiquées avec une IST mais aussi, offre alternative pour le patient ayant une IST (distribution primaire)



Lors d'une consultation (<u>stratégie fixe/point d'entrée</u>), le professionnel de la santé (<u>dispensateur</u>) propose à la personne diagnostiquée avec une IST (<u>distribution primaire</u>) un dépistage du VIH: c'est une indication médicale car le risque de VIH + est plus élevé parmi ces personnes.

La cible prioritaire de l'ADVIH est le partenaire de la personne diagnostiquée avec une IST.

3. Stratégie Fixe pour les HSH, travailleuses du sexe et usagères / usagers de drogue



Lors de consultations au sein d'un centre aux populations clés (stratégie fixe/point d'entrée), les professionnels de la santé (dispensateur) proposeront populations clés (distribution primaire) la possibilité de distribuer l'autotest à leurs partenaires et/ou amis/pairs qui fréquentent les associations pas communautaires et/ou leur client (distribution secondaire).



MODULE 2 – PRESENTATION DE L'ADVIH ORALORAQUICK© ET DES SUPPORTS POUR SA DISPENSATION



FICHE PRATIQUE N°2.1: LES 5 « C »

- Le dépistage du VIH doit toujours être réalisé à titre volontaire, confidentiel et gratuit
- Quelle que soit l'approche adoptée, en matière de dépistage du VIH les avantages offerts en termes de santé publique doivent toujours l'emporter sur les risques et préjudices potentiels
- Tout service de dépistage du VIH, y compris l'auto dépistage, doit respecter les « 5 C » définis par l'OMS : Consentement, Confidentialité, Conseil, résultats Corrects et Connexion
- Le dépistage du VIH à des fins de diagnostic doit toujours être réalisé à titre volontaire et le consentement donné par le patient doit reposer sur des informations fournies avant le test
- Il est important d'informer les personnes effectuant un autotest que le dépistage obligatoire ou coercitif n'est jamais justifié


Les « 5 C » sont des principes qui s'appliquent à tous les services de dépistage du VIH, en toutes circonstances. Ces principes sont les suivants :

Consentement	Consentement après avoir été informé ; Consentement clairement signifié.
	Lorsqu'une personne demande à bénéficier d'un autotest de dépistage du VIH ou signale qu'elle en a utilisé un, <u>il ne faut en aucun cas présumer</u> qu'elle donne par là-même son consentement ou qu'elle l'a implicitement donné.
	Il est essentiel d'informer les personnes vivant avec le VIH que la notification assistée aux partenaires est un service fondé sur <u>la participation volontaire</u> et d'expliquer aux partenaires des PVVIH que <u>le dépistage est volontaire</u> , et non obligatoire.
Confidentialité	Confidentialité des échanges ; Confidentialité des résultats du dépistage.
	Si la confidentialité doit bien être respectée, il ne faut cependant jamais qu'elle alimente un climat de secret, de stigmatisation et de honte.
	Toujours demander quelles sont les personnes que les personnes se testant souhaitent informer et comment communiquer cette information (le partage de la confidentialité avec des personnes de confiance est souvent bénéfique pour les PVVIH).
Conseil	Conseil avant le test ; Conseil après le test.
	En groupe, si la situation si prête, à minima toujours en privé. La personne testée doit bénéficier de conseils de qualité après le test, adaptés aux résultats obtenus.
	Des mécanismes d'assurance-qualité, ainsi que des systèmes d'appui à la supervision et à l'encadrement, doivent être en place pour garantir un conseil de qualité.
Résultats	Assurance qualité ; Exactitude du diagnostic
corrects des tests	Les prestataires des tests de dépistage du VIH doivent fournir des services de dépistage de qualité et des mécanismes pour garantir l'exactitude du diagnostic obtenu. L'assurance de la qualité peut s'appuyer à la fois sur des mesures internes et externes et doit bénéficier d'un soutien de la part du laboratoire national de référence.
Connexion	Avec les services de prévention, de traitement et de soin
	Cette connexion doit inclure la prestation d'un suivi efficace et approprié. Lorsque l'accès aux soins est inexistant ou inadéquate, le dépistage du VIH présente peu d'avantages pour les personnes séropositives.
	Dans le cadre de l'auto dépistage du VIH, la connexion comprend également la liaison avec des services de dépistage permettant de réaliser un nouveau test où les résultats peuvent être confirmés et un diagnostic posé par un prestataire formé.



FICHE PRATIQUE N°2.2: STRATEGIE DE DEPISTAGE DE L'ADVIH ET MODALITES DE DISPENSATION

L'auto dépistage du VIH est un **processus** par lequel la personne **prélève elle-même l'échantillon** (fluide oral ou sang), **effectue le test** pour le VIH, puis **interprète son résultat**, souvent dans un **cadre privé**, seule ou avec une personne de confiance.



AO = Epreuve 0 (« Assay 0 », test à des fins de triage)

Les autotests de dépistage du VIH ne délivrent pas de diagnostic définitif de séropositivité.

L'autotest de dépistage du VIH est considéré comme un test à des fins de triage, ce qui implique que les personnes ayant obtenu un résultat réactif doivent faire l'objet de tests supplémentaires, réalisés par un prestataire formé selon une stratégie de dépistage validée sur le plan national.

L'interprétation d'un résultat non réactif dépendra du risque d'exposition au VIH.

L'autotest de dépistage du VIH avec assistance et sans assistance

<u>L'autotest de dépistage du VIH avec assistance directe</u> se rapporte aux situations où la personne bénéficie, avant ou pendant le test, d'une démonstration en personne réalisée par un prestataire formé ou un pair, lui montrant comment effectuer le test et comment en interpréter les résultats.

<u>L'autotest de dépistage du VIH sans assistance</u> se rapporte aux situations où la personne réalise le test uniquement à l'aide d'un kit d'autotest de dépistage accompagné d'une notice d'utilisation du fabricant.

Les approches d'autotest de dépistage du VIH avec assistance directe et sans assistance peuvent toutes deux inclure des outils complémentaires (permanences téléphoniques, messages SMS, vidéos, médias sociaux et applications sur internet), fournissant à la personne un appui technique, des conseils et une orientation vers un dépistage supplémentaire ou vers d'autres services, notamment les services de prévention, de soins et de traitement de l'infection à VIH.

Outils d'aide à l'auto-dépistage du VIH avec assistance directe ou sans assistance

Outils d'aide	Assistance directe	Sans assistance
Séance d'information en personne, démonstration individuelle ou en groupe illustrant la bonne manière d'utiliser le kit et d'interpréter les résultats	X	
Démonstrations visuelles ou via les médias sociaux sur internet illustrant la bonne manière d'utiliser le kit et d'interpréter les résultats	x	x
Assistance en personne pendant la réalisation du test	X	
Instructions d'utilisation : - Illustrations/texte - Brochures ou dépliants contenant des informations sur les services locaux de dépistage et de traitement de l'infection à VIH et leurs coordonnées : dispensaire, permanence téléphonique, etc. - Instructions sur support multimédia	x	х
Aide à distance par téléphone, médias sociaux, SMS, codes QR, applications de messagerie sur internet ou sur téléphone mobile	X	X



FICHE PRATIQUE N°2.3: INFORMATION, SOUTIEN ET ORIENTATION DES USAGERES ET USAGERS

- Les autotests de dépistage du VIH ne délivrent pas de diagnostic définitif.
- L'autotest de dépistage du VIH peut être réalisé avec assistance directe (humaine) ou sans assistance.
- L'information, le soutien et l'orientation sont essentiels afin que la personne soit référée vers les services adaptés en fonction du résultat obtenu

Les personnes qui effectuent un autotest de dépistage du VIH doivent prendre conscience que :

- Un résultat réactif n'est pas un diagnostic positif pour le VIH et doit être confirmé avec dépistage supplémentaire. Si le résultat est confirmé, il faut expliquer à la personne concernée où et comment elle peut accéder au traitement et aux soins
- Un résultat non réactif est supposé négatif. Les personnes qui sont exposées à un risque élevé ou constant de VIH, ou qui pourraient avoir été exposés au VIH dans les six semaines qui précèdent, devraient se faire dépister à nouveau et être orientés vers un service de prévention du VIH adapté (ex : prophylaxie post exposition ou préexposition, circoncision médicale volontaire)
- Un résultat non valide (interprétation impossible) nécessite de recommencer le test à nouveau soit avec un nouveau kit d'ADVIH, soit en se rendant au centre de dépistage

<u>Différentes stratégies et outils de mise en relation avec les services de dépistage et de soins après un autotest de dépistage du VIH sont possibles</u> :

- Suivi proactif à base communautaire assuré par des pairs et/ou des agents à portée communautaire (en personne ou par téléphone/SMS/plateformes de messagerie à caractère social). Quand des agents communautaires formés sont responsables de la dispensation des kits d'autotest de dépistage du VIH, ces agents peuvent proposer un suivi et des conseils supplémentaires après l'auto dépistage, ainsi qu'une assistance et/ou un accompagnement vers les services chargés de réaliser les tests de confirmation.
- **Distribution de brochures et de dépliants avec les kits d'ADVIH**, contenant des informations sur les services de dépistage du VIH et les services de prévention, de traitement et de soins de l'infection à VIH, ainsi que des informations sur d'autres maladies comme la tuberculose, les infections bactériennes sexuellement transmissibles et l'hépatite virale.
- Permanences téléphoniques que les utilisateurs appellent avant ou après la réalisation du test pour bénéficier d'une aide psychosociale et/ou technique qui peuvent également fournir des contacts et des liens vers les services de dépistage VIH et d'autres services pour le VIH, ainsi que vers des services non médicaux comme des programmes d'aide juridique ou d'aide aux victimes de violences.
- Programmes et applications sur Internet /vidéos pour fournir des informations afin de se mettre en relation avec les services pertinents d'une multitude de façons. Certaines approches utilisées à ce jour comprennent des services et des programmes de conseil en direct, en ligne via des échanges de messages, des conseils sous forme audio ou vidéo et des programmes qui proposent des instructions étape par étape sur ce qu'il faut faire quand on a obtenu un résultat réactif.



FICHE PRATIQUE N°2.4: SUPPORTS POUR LA DISPENSATION ET LA REALISATION DE L'ADVIH

L'objectif de ces supports ? Renforcer la qualité de la dispensation et de la réalisation de l'ADVIH. Dans le cadre du projet ATLAS, il existe cinq supports.

La qualité de la dispensation joue un rôle crucial afin de s'assurer que la personne saura réaliser son test, interpréter le résultat et se rendre vers un service adapté.

<u>Dans le cadre du projet ATLAS, le fait d'avoir deux niveaux de dispensation renforce cet enjeu</u>. En effet le premier dispensateur (professionnel de santé/ pair éducateur) doit à la fois expliquer :

- **En distribution primaire :** à la personne à qui elle donne l'autotest de dépistage du VIH comment elle peut le réaliser correctement dans le cas où celle-ci l'utilisera chez elle et pour elle-même.
- **Pour la distribution secondaire :** A cette même personne sur comment elle pourra elle-même dispenser l'autotest aux cibles secondaires du projet (partenaires, pairs, clients)

	dispenser i autotest aux cibies secondaires du projet (partenaires, pairs, clients)			
1	Notice	En français, la notice a été adaptée à chaque pays en insérant le numéro de la ligne gratuite national.		
2				
3	Développée en concertation avec l'ensemble des partenaires dans chaque pays, elle permet de clarifier et compléter certains messages : Le recours à la vidéo et à ligne gratuite nationale Les choses importantes à faire et ne pas faire L'interprétation du résultat et la conduite à tenir L'âge légal de dépistage dans chaque pays Liste de services de référencement pour les personnes Traçabilité du kit (canal de dispensation et partenaire) Invite les appelants à participer à l'étude par téléphone (autocollant adjoint)			
4	4 Ligne Appels gratuits et anonymes. Dans chaque pays, les écoutants sont formés à accompagner les usagers pour réaliser l'autotest, interpréter les résultats et orienter vers les services adaptés, ou pour toute question relative au VIH.			
		Sénégal		
	CTAOPALS Centre de Traitement Ambulatoire CTAITO SANTÉ N° VERT 800 00 30 30 APPELORATUEL ANOVAME ET CONFICIEN TIESE SI VOUS PORT PORTÉGNET DE LOS. Frierpitter vous des full of ade pour rigidaire le los. Frierpitter vous des full of ade pour rigidaire le los. Appelec de ligne granulé et arcetyme au 800 60 30 30.			
5	Site internet	Ce site présente le projet ATLAS avec des informations sur l'ADVIH. Il intègre des pages spécifiques par pays présentant des informations contextualisées pour l'usagère et l'usager (outils, documents et sites ressources), ainsi que la liste des services de référencement du pays : https://atlas.solthis.org/		



FICHE PRATIQUE N°2.5: SCENARIO D'INTERPRETATION DES RESULTATS

OmOute E	La présence de deux traits complets signifie que le test est réactif. La personne est peut-être séropositive. Un test supplémentaire est nécessaire pour confirmer que la personne est séropositive.
CHOCAL CONTRACTOR OF THE CONTR	La présence de deux traits complets, même à peine visibles, signifie que le test est réactif. La personne est peut-être séropositive. Un test supplémentaire est nécessaire pour confirmer que la personne est séropositive.
OrnOpicE	Un trait en face du « C » et pas de trait en face du « T » indiquent que le test n'est pas réactif. La personne est séronégative. S'il s'est écoulé moins de 3 mois depuis la dernière conduite à risque, il attendre que les 3 mois soient passés pour faire le test à nouveau.
OrmOuk-f	Un fond rouge qui obscurcit le test indique que le test ne marche pas et doit être refait. La personne doit se procurer un autre autotest ou se rendre dans un centre de dépistage.
Ora Quick	Pas de trait en face du « C » indique que le test ne pas et doit être refait. La personne doit se procurer un autre autotest ou se rendre dans un centre de dépistage.
OraChack ANGE ANGE C4	Pas de trait en face du « C » même avec un trait en face du « T » indique que le test ne marche pas et doit être refait. La personne doit se procurer un autre autotest ou se rendre dans un centre de dépistage.



FICHE PRATIQUE N°2.6: ERREURS OBSERVEES LORS DE LA REALISATION DE L'ADVIH

Ces erreurs fréquemment observées lors de la réalisation de l'autotest oral OraQuick sont adressées dans les messages clés et les différents supports disponibles.

- La personne ne lit pas la notice pour réaliser l'ADVIH
- La personne veut boire ou renverser le liquide contenu dans le tube
- La personne veut utiliser le test comme une brosse à dent ou en posant juste la spatule sur la gencive
- La personne mange du chewing gum, boit au moment de faire le test ou dans les 15mn avant le test
- La personne ne lit pas ses résultats dans la période des 20 à 40 minutes préconisées
- Les personnes sous ARVs veulent se tester avec un kit d'ADVIH
- La personne n'arrive pas à interpréter ses résultats correctement
- La personne ne sait pas quoi faire après avoir lu ses résultats

RAPPEL : La Notice, la brochure complémentaire, la Vidéo et la ligne téléphonique gratuite doivent être promues et utilisées par les usagères et usagers pour les aider !!



FICHE PRATIQUE N°2.7: QUESTIONS/REPONSES FREQUENTES

1. Combien de temps après une conduite à risque puis-je me tester?

Vous pouvez faire un test à tout moment, mais si vous le faites moins de 3 mois après une conduite à risque et que le test est négatif, il se peut que le résultat soit inexact. Il est préférable de refaire le test 3 mois après la conduite à risque pour avoir confirmation du résultat. Vous pouvez également demander à faire le test dans un établissement de santé.

2. Pourquoi ne pas faire le test immédiatement après une conduite à risque ?

Lorsque vous avez été infecté par le VIH, votre corps tente de combattre le virus du VIH en produisant des anticorps naturels. Ces anticorps peuvent être trouvés dans votre salive. Il faut à votre corps jusqu'à 3 mois pour créer ces anticorps à des taux détectables par ce test.

3. Comment fonctionne l'autotest?

Le test OraQuick® est un test qualitatif à usage unique pour détecter les anticorps (défenses de votre corps qui vous aident à combattre l'infection) du VIH de type 1 et 2 dans la salive. Cela ne veut pas dire qu'il y a présence de VIH dans la salive car le test cherche la présence des défenses dans la salive, pas le virus. Le VIH ne se transmet pas par la salive

4. Quelle est la précision du test OraQuick?

Le test OraQuick® est pré qualifié par l'Organisation mondiale de la santé. Dans une étude clinique, 900 personnes ne connaissant pas leur statut VIH ont reçu l'OraQuick® pour auto-administration. Les résultats ont été comparés à un test de laboratoire de 4e génération. Les résultats de laboratoire indiquent que 99,4 % des personnes ont correctement communiqué un résultat positif et 99 % des personnes ont correctement communiqué un résultat négatif. Seulement 1,8 % des sujets de l'étude (16 sur 900) n'est pas parvenu à obtenir un résultat de test.

5. Est-ce que je risque d'être infecté par le VIH en utilisant ce test ?

Ce test ne contient aucune substance ou de virus VIH susceptible d'entraîner une infection par le VIH. Le test OraQuick® est un test pour détecter les anticorps (défenses de votre corps qui vous aident à combattre l'infection) du VIH dans la salive. Cela ne veut pas dire qu'il y a présence de VIH dans la salive car le test cherche la présence des défenses dans la salive, pas le virus. Le VIH ne se transmet pas par la salive

6. À quelle fréquence est-il recommandé de faire un test de dépistage du VIH ?

Si vous n'avez jamais été testé pour le VIH, vous devriez être testé au moins une fois car il est important de connaitre son statut. Si vous avez des pratiques (conduites à risque) susceptibles d'entraîner une infection par le VIH, vous devriez être testé au moins une fois par an (recommandation de l'Organisation mondiale de la santé) et jusqu'à 3-4 fois par an si ces comportements à risque sont réguliers.

7. Que signifie un résultat non réactif/négatif?

Un résultat non réactif/négatif signifie que le test n'a pas détecté d'anticorps VIH; cependant, il peut falloir jusqu'à 3 mois à partir d'une conduite à risque pour que le test détecte le VIH. S'il s'est écoulé au moins 3 mois depuis votre dernière conduite à risque et que vous avez scrupuleusement suivi le mode d'emploi, vous n'êtes probablement pas infecté par le VIH. S'il s'est écoulé moins de 3 mois depuis votre dernière conduite à risque, attendez que les 3 mois soient passés pour faire le test à nouveau.

8. Que dois-je faire en cas de résultat négatif?

Si vous n'avez pas eu de conduite à risque au cours des 3 derniers mois, et que vous avez scrupuleusement suivi le mode d'emploi, vous êtes probablement VIH négatif. Si vous n'avez pas bien suivi le mode d'emploi, il vaut mieux refaire le test pour être sûr que le résultat est correct. Si vous avez eu des conduites à risque au cours des 3 derniers mois, vous être peut-être dans la période « fenêtre ». La période fenêtre correspond à la durée pendant laquelle une personne est déjà infectée par le VIH mais où son corps n'a pas encore développé d'anticorps. Si vous pensez avoir été exposé au VIH au cours des 3 derniers mois, vous devriez refaire le test de dépistage du VIH 3 mois après toute conduite à risque. Si vous continuez à avoir des conduites à risque susceptible d'entraîner une infection par le VIH, vous devez faire le test à intervalles réguliers.

9. Que signifie un résultat réactif/positif?

Un résultat réactif/positif signifie que vous avez peut-être le VIH. Des tests supplémentaires doivent être effectués dans un centre de dépistage pour confirmer le résultat.



10. Que dois-je faire en cas de résultat réactif/positif?

Vous avez besoin d'un suivi auprès d'un établissement de santé pour subir d'autres tests pour confirmer le résultat. À ce stade, le personnel de la clinique locale, votre médecin ou un professionnel de la santé de la région vous expliquera les prochaines mesures à prendre.

11. Comment puis-je savoir si j'ai bien fait le test?

Si le test se déroule correctement, vous verrez une ligne à côté de la lettre « C » inscrite sur le dispositif. S'il n'y a pas de ligne à côté du « C », c'est que le test n'a pas fonctionné.

12. Puis-je utiliser ce test si je suis enceinte?

Oui, si vous êtes enceinte, vous pouvez vous tester à tout moment.

13. Puis-je utiliser ce test si je prends des médicaments?

Si vous prenez un traitement pour le VIH (ARV), c'est que vous avez déjà été diagnostiqué séropositif. Vous ne pouvez pas faire ce test car vous risquez d'avoir un résultat faux négatif. Si vous prenez d'autres médicaments que ceux contre le VIH, vous pouvez utiliser ce test

14. Puis-je utiliser ce test pour mon enfant?

Cet autotest a pour objectif de dépister dans votre réseau/entourage les personnes qui sont à risque d'infection VIH et qui ne fréquentent pas les services de santé. Le test n'est pas recommandé pour les enfants de moins de 12 ans. Par ailleurs l'âge légal pour se dépister seul dans votre pays est de 15 ans au Sénégal, 18 au Mali et 16 en Côte d'Ivoire. Il est donc recommandé de faire dépister votre enfant dans un centre de dépistage si votre enfant est plus jeune. Vous ne pouvez pas forcer votre enfant à faire le test.

15. Est-ce qu'une personne peut utiliser le test alors qu'il a bu de l'alcool ou s'il a pris des drogues ?

Avoir bu de l'alcool ou pris des drogues ne diminue pas l'efficacité du test **MAIS** la personne risque d'avoir plus de difficultés à bien le réaliser, bien interpréter le résultat ou savoir quoi faire en fonction du résultat. Il est donc préférable de ne pas l'utiliser sous l'emprise de l'alcool ou de drogues.

16. Est-ce que je peux me tester si je prends un traitement VIH ARV

Si vous prenez un traitement pour le VIH (ARV), c'est que vous avez déjà été diagnostiqué séropositif. Vous ne pouvez pas faire ce test car vous risquez d'avoir un résultat faux négatif.

17. Est-ce que je peux réutiliser/garder le test après ? Est-ce que je peux garder le test pour montrer que je suis séronégatif

Non, ce test est à usage unique. Il est important de ne pas le conserver et de le jeter à la poubelle après avoir lu le résultat (qui doit être lu entre 20 et 40 minutes après avoir plongé le dispositif dans le liquide) car avec le temps la zone de résultat peut changer (souvent de négatif à positif) et indiquer un résultat faux.

18. Ou dois-je conserver le test?

Le test ne nécessite pas d'être conservé au réfrigérateur mais doit être conserver à l'écart du soleil ou dans un endroit particulièrement chaud

19. Dois-je partager mon résultat?

Non, c'est confidentiel. Vous pouvez choisir de partager vos résultats MAIS si vous avez un résultat réactif/positif, vous devez d'abord effectuer un test de confirmation pour être sûr de votre statut. Vous pouvez aussi appeler la ligne téléphonique gratuite et anonyme pour en parler et savoir comment faire.

20. Combien de temps cela prend de faire le test ?

C'est rapide!! Une fois que vous avez fait le test qui prend 5 minutes environ, vous pouvez lire votre résultat après 20 minutes.

21. Est-ce que le test détecte d'autres maladies ?

Non ce test ne détecte que le VIH

22. Est-ce que le test est gratuit?

Oui ce test est gratuit comme cela est mentionné sur la pochette

23. Est-ce que le test est accessible pour tout le monde?

Cet autotest a pour objectif de dépister dans votre réseau/entourage les personnes qui sont à risque d'infection VIH et qui ne fréquentent pas les services de santé



FICHE PRATIQUE N°2.8: MESSAGES CLES

Pour promouvoir l'autotest de dépistage du VIH-les avantages à s'auto dépister

- Vous ou votre partenaire/ami peut réaliser l'autotest de dépistage du VIH au moment où vous le souhaitez en toute discrétion
- Vous pouvez dispenser vous-même l'autotest à votre partenaire /pairs/ clients
- L'autotest de dépistage du VIH encourage les personnes à se dépister, notamment car c'est un outil nouveau et fiable.
- L'autotest de dépistage du VIH vous permet de connaître votre statut et vous permet de choisir à qui vous souhaitez en parler
- Le résultat du test est totalement confidentiel puisque vous êtes le seul à lire votre résultat
- En cas de test réactif, vous choisissez comment et à quel moment vous irez faire le test de confirmation
- Connaître votre statut VIH est une étape pour vous maintenir en bonne santé car si vous êtes séropositif, des traitements efficaces existent et vous permettent de vivre longtemps tout en réduisant le risque que vous contaminiez d'autres personnes
- Connaitre son statut VIH permet d'être plus serein

Pour le dispensateur et/ou l'usagère et l'usager final au moment de la dispensation

- L'autotest de dépistage du VIH doit résulter d'un choix libre, éclairé et autonome de l'intéressé. Personne ne doit être forcé à réaliser un dépistage.
- Une personne qui prend un traitement pour le VIH (ARV) a déjà été diagnostiquée séropositive. Ce test n'est pas indiqué pour ces personnes car le test peut donner un résultat faux négatif.
- Le test n'est pas recommandé pour les enfants de moins de 12 ans. Par ailleurs l'âge légal pour se dépister seul dans votre pays est de 16 ans en Côte d'Ivoire, 18 ans au Mali, 15 ans au Sénégal. Il ne faut donc pas utiliser/dispenser ce test pour les enfants plus jeunes.
- L'utilisateur d'un autotest de dépistage du VIH doit lire attentivement la notice avant de commencer le test ou utiliser les autres supports qui l'aideront à réaliser le test, interpréter le résultat et savoir quoi faire en fonction du résultat. Plus particulièrement la vidéo et la ligne téléphonique gratuite sont d'une grande aide pour cela.
- L'autotest de dépistage du VIH fournit un résultat fiable sur le statut sérologique de l'utilisateur s'il est bien réalisé.
- Il faut attendre 15 minutes après avoir bu et/ou mangé et 30 minutes après s'être lavé les dents avant de pouvoir faire le test.
- Il ne faut pas boire ou verser le liquide qui est dans le tube car il sert à donner le résultat.
- Une fois la salive collectée et la spatule introduite dans le tube avec le liquide, Il est important d'attendre au moins 20 minutes avant de lire le résultat et au maximum 40 minutes. Avant et au-delà de cette période, le résultat n'est pas fiable.
- Un résultat réactif/positif signifie que vous avez peut-être le VIH. Des tests supplémentaires dans un centre de dépistage doivent être effectués dans un centre de dépistage pour confirmer le résultat. N'hésitez pas à appeler la ligne téléphonique gratuite pour vous faire aider
- Un résultat non réactif/négatif signifie que le test n'a pas détecté d'anticorps VIH; cependant, il peut falloir jusqu'à 3 mois à partir d'une conduite à risque pour que le test détecte le VIH. S'il s'est écoulé au moins 3 mois depuis votre dernière conduite à risque, vous n'êtes probablement pas infecté par le VIH. S'il s'est écoulé moins de 3 mois depuis votre dernière conduite à risque, attendez que les 3 mois soient passés pour faire le test à nouveau
- Un résultat non valide nécessite de refaire le test soit en vous procurant un nouvel autotest soit en allant dans un centre de dépistage.
- Ce test est à usage unique et ne peut pas être réutilisé. Il est important de ne pas le conserver et de le jeter à la poubelle après avoir lu le résultat car avec le temps la zone de résultat peut changer (souvent de négatif à positif) et indiquer un résultat faux.



MODULE 3 – LE ROLE, LES QUALITES ATTENDUES DES PROFESSIONNELS DE SANTE ET LA DISPENSATION DE L'AUTOTEST DE DEPISTAGE DU VIH DANS LE PROJET ATLAS



FICHE PRATIQUE N°3.1: DISCRIMINATION ET STIGMATISATION A L'EGARD DES PVVIH

- Les peurs irrationnelles et les attitudes et jugements négatifs
- Des comportements discriminatoires dans tous les secteurs de la société
- Découragement des individus d'accéder aux services de santé (prévention, dépistage, traitement)
- Atteintes à la confidentialité sapent la confiance et la volonté de se faire dépister
- Peur de l'exclusion sociale, perte de soutien social et de partenaires, relations conjugales tendues
- Les populations exposées au risque d'infection VIH font face à de fortes stigmatisations
- Les populations clés évitent le dépistage du VIH
- La stigmatisation des populations clés est renforcée par des lois pénales et obstacles structurels

Effets de la stigmatisation et discrimination sur l'accès aux soins de prévention, dépistage et traitement

Non-divulgation du statut VIH ou comportement à risque Evitement des services de santé Effets sur les Besoins en prévention non satisfaits Réticence au dépistage ou au traitement soins de santé Manque de conseil Soins médiocres ou absences de soins Déni de traitement ou traitement involontaire Arrestation, violence ou Discrimination en matière chantage des populations de santé à l'égard des **Manifestations** populations clés et des groupes clés Stérilisation ou avortement marginalisés de la forcé Discrimination liée au VIH en Manque d'informations et matière de santé discrimination de services appropriés et Stigmatisation accessibles Violation de la vie privée Stigmatisation sociétale et Lois relatives à l'âge du discrimination à l'égard des Moteurs de la consentement populations clés et des groupes Criminalisation des populations clés marginalisés discrimination Criminalisation du VIH Stigmatisation et discrimination Idées fausses sur le VIH générales liées au VIH

Les lois pénales, les attitudes communautaires, la désinformation, les préjugés et la peur constituent autant de moteurs de la stigmatisation et de manifestations de la discrimination qui affectent l'accès aux soins de santé des personnes vivant avec le VIH et des populations clés.

Eliminer la stigmatisation et discrimination renforce l'accès aux soins de prévention, dépistage et traitement

Soins de santé de qualité Recours accru aux services de santé Effets sur les Divulgation des comportements à risque et du statut VIH aux services de santé soins de santé Augmentation du recours au dépistage et au Réduction des Réduction de la stigmatisation intériorisée Protection juridique contre la discrimination et la violence manifestations Confidentialité de la Soins de santé respectueux Informations et services accessibles et adaptés Normes pour les professionnels Décriminalisation des populations Education des prestataires Réduction de la Lois protectrices de services de santé Responsabilité devant les cours et Sensibilisation des populations discrimination clés aux droits Conseil juridique et représentation Surveillances des services de santé

Attaquer ces facteurs, en éliminant les lois néfastes, en introduisant des lois protectrices, en éduquant les détenteurs de droits et les fournisseurs de services et en habilitant les communautés à défendre leurs droits, permet de combler le fossé existant entre ceux qui peuvent accéder aux services et ceux qui ne peuvent pas, favorisant ainsi la santé de tous.



FICHE PRATIQUE N°3.2: LIEN ENTRE CONSEIL ET DISPENSATION DE L'ADVIH DU PROJET ATLAS

- L'ADVIH, par sa nature, ne donne pas systématiquement la possibilité de faire un conseil pré et post dépistage complet
- Si la possibilité d'accompagner la personne existe dans le processus de dépistage, le TROD sera prioritairement proposé dans ce cadre
- Dans la plupart des cas la dispensation se fera avec un conseil en amont du dépistage visant à ce que la personne soit capable de réaliser seule l'auto dépistage
- La principale stratégie de dispensation du projet est <u>la stratégie secondaire</u> (partenaires/pairs/clients) pour laquelle le conseil ne sera pas apporté par le professionnel de la santé ou l'éducateur pair mais par la personne à qui le kit d'autotest sera remis (notion de distributeur relai)

Il y a donc deux types approches pour apporter conseil à la personne :

- Le conseil dans le cas d'une dispensation primaire assistée (professionnels de la santé, éducateurs pairs et écoutants à distance) qui sera similaire au conseil avant et après tout dépistage du VIH
- Le conseil dans le cas d'une dispensation non assistée (la personne fera le test chez elle) ou pour la dispensation secondaire (professionnels de la santé et éducateurs pairs) qui sera adapté et se concentrera sur le conseil en amont du dépistage.

Dans les deux cas, le professionnel de la santé, l'éducateur pair ou l'écoutant de la ligne téléphonique devront démontrer des qualités d'écoute et de conseil.



FICHE PRATIQUE N°3.3: LA POSTURE D'ECOUTE ACTIVE ET DE CONSEIL

Les qualités du conseil de dépistage :

- <u>L'écoute</u> (regarder la personne dans les yeux, encourager la personne à parler, communication non verbale)
- <u>L'empathie</u> (reformulation des propos, être attentif aux signaux non verbaux, poser des questions ouvertes)
- o L'authenticité (être honnête, être soi-même, être à l'aise)
- o <u>L'acceptation inconditionnelle de l'autre</u> (zéro jugement, être attentionné, ne pas contredire)
- <u>La qualité de la présence</u> (être concret et concentré, ce qui se joue c'est ici et maintenant, poser des questions)
- La capacité à faciliter l'expression des ressentis du patient (accompagner les émotions)
- <u>La capacité à donner de nouvelles perspectives</u> (apporter des faits et des données qui permettent au patient de se projeter)

Le lien avec l'ADVIH:

- Ces qualités de conseil sont utilisées dans les tests de dépistage rapide et s'appliquent dans le cadre de réalisation avec l'ADVIH
- Cependant, l'ADVIH n'est pas nécessairement dans une logique de dispensation assistée, le conseil sera donc différent et adapté au besoin.

Les principales qualités du conseil pour la dispensation d'un ADVIH (qu'elle soit assistée ou non assistée):

- Soyez à l'écoute, non discriminant/stigmatisant et sans jugement de la personne à qui vous vous adressez quel que soit sa situation
- Basez-vous sur les besoins, les ressources et les préférences de la personne, laissez-la exprimer ses besoins et ressentis
- Répondez aux questions honnêtement
- Soyez structuré dans vos réponses, facilitez la communication et l'échange
- Reconnaissez que le changement de comportement n'est pas simple et que les personnes ne sont jamais parfaites
- Soyez positifs et stimulez les questions
- Soyez dans une posture de soutien à la personne




FICHE PRATIQUE N°3.4: LES SPECIFICITES DE LA DISPENSATION DANS LE CADRE DU PROJET ATLAS

Au-delà du conseil associé à la dispensation de l'ADVIH, il est important de prendre en considération pour les professionnels de la santé et les éducateurs par les pairs certaines spécificités liées au canal de dispensation (pour rappel, 10 canaux, en fonction des populations ciblées). Dans le cadre du projet ATLAS, 3 grandes spécificités sont à noter:

- **Le dépistage des cas index** (1^{er} canal du schéma présenté préalablement) qui implique un accompagnement spécifique des PVVIH et des enjeux liés à la notification des partenaires.
- Le dépistage basé sur la distribution secondaire pour lequel l'utilisateur de l'ADVIH ne sera pas la personne conseillée au moment de la dispensation. Ce sera le cas avec les canaux suivants : partenaires des PVVIH (au-delà des enjeux de la notification), partenaires des patients ayant une IST, partenaires/pairs/clients des populations clés ciblées et partenaires des jeunes.
- **Le dépistage des jeunes** (16-24 ans) pour lesquels une évaluation des risques sera préalable à la dispensation.

Au-delà des spécificités de dispensation mentionnées, il est important de présenter le rôle des écoutants des lignes téléphonique nationales qui eux interviendront auprès de n'importe quel usagère ou usager, avant, pendant ou après le dépistage.








FICHE PRATIQUE N°3.5: DEFINITIONS DE LA NOTIFICATION




Un prestataire formé incite les personnes vivant avec le VIH à divulguer ellesmêmes leur statut à leurs partenaires sexuels et/ou à leurs partenaires

d'injection de drogues, et à suggérer également à ceux-ci de se faire dépister pour le VIH étant donné leur exposition potentielle à l'infection.



Un prestataire formé aide les patients index (qui ont signifié leur consentement) à divulguer leur statut ou à notifier anonymement leur exposition à l'infection à VIH à leurs partenaires sexuels. Le prestataire


propose ensuite un dépistage du VIH à ces partenaires. La notification assistée des partenaires est effectuée lors d'une notification par le prestataire, contractuelle ou double.



Avec le consentement de la PVVIH, le prestataire contact le(s) partenaire(s) de cette personne et lui propose un dépistage volontaire du VIH.

Les PVVIH ont passé avec un prestataire formé un contrat selon lequel Elles orienteront leur partenaire vers des services de dépistage du VIH dans un délai


convenu. Une fois celui-ci dépassé, le prestataire contacte les partenaires directement et leur propose un dépistage volontaire du VIH.



Le prestataire accompagne les PVVIH lorsqu'elles révèlent leur statut à leurs partenaires. Il propose un dépistage volontaire à ceuxci.



FICHE PRATIQUE N°3.6: OBJECTIFS ET CADRE DE LA NOTIFICATION AUX PARTENAIRES DANS LE PROJET ATLAS



- Nous ne sommes pas dans le cadre de la notification/cas index même si les enjeux peuvent être similaires dans la dynamique et les implications puisqu'il s'agit pour la personne ciblée d'annoncer à son partenaire qu'elle a été diagnostiqué avec une IST ou de l'inviter à se dépister.
- La loi VIH et les stratégies VIH de votre pays inscrit la notification des partenaires des personnes vivant avec le VIH comme une pratique recommandée /obligatoire.

Avantage de la notification assistée

- <u>La notification assistée des partenaires est un moyen simple et efficace</u> d'atteindre ces personnes ni diagnostiquées, ni conscientes de leur exposition au VIH
- <u>Depuis des décennies, la notification assistée des partenaires est une importante approche de santé publique</u> mais non systématiquement appliquée pour les personnes vivant avec le VIH
- Renforce le recours aux services de dépistage du VIH des partenaires
- Augmente la proportion de nouveaux diagnostics chez les personnes vivant avec le VIH
- Oriente davantage de partenaires vers les services de traitement et de soins
- <u>Le dépistage du VIH chez les partenaires et au sein des couples</u> offre un soutien mutuel pour l'accès aux services ; une amélioration de l'observance et de la poursuite du traitement ; un appui renforcé pour la prévention de la transmission de la mère à l'enfant ; une priorité donnée à la prévention du VIH chez les couples séro-discordants.

Les préférences concernant la méthode de notification du partenaire varient selon la population, l'âge (notamment chez les jeunes) et le type de partenaire (principal ou occasionnel).

La notification assistée du partenaire peut prendre différentes formes : conversation en face à face, lettre, appel téléphonique, message texte (SMS), vidéo, courriel et système de messagerie Internet. Il faut veiller à ce que la bonne personne reçoive le message et à préserver l'anonymat de la PVVIH et du partenaire notifié.



Approches de l'offre de services de notification aux partenaires des PVVIH

Services de notification assistée aux partenaires
(notification par le prestataire, notification
contractuelle ou notification double)

Services de notification passive des partenaires

- Le prestataire donne des conseils et propose une assistance aux PVVIH pour la divulgation et la notification à leurs partenaires de leur statut sérologique en employant l'une des trois méthodes de notification
- Le prestataire contacte les partenaires par téléphone, Internet, courriel ou visite à domicile pour les informer de leur exposition potentielle à une infection par le VIH et leur propose des services de dépistage du VIH
- Le prestataire offre des services de dépistage du VIH à domicile pour l'ensemble du foyer (partenaires et membres de la famille)

- Le prestataire donne des conseils et encourage les PVVIH à divulguer leur statut sérologique à leurs partenaires et à les informer de leur exposition possible au VIH, soit en personne, soit par téléphone, SMS, courriel, etc.
- Le prestataire remet aux PVVIH une lettre ou une fiche invitant leurs partenaires à se rendre dans un établissement de santé. Quand les partenaires se présentent à l'établissement de santé, des services de dépistage du VIH leur sont proposés.
- Les PVVIH peuvent recourir à des services de messagerie anonyme, comme le téléphone, le courriel ou Internet pour informer elles-mêmes leurs partenaires.

La notification du partenaire et conséquences dommageables

- <u>Les essais contrôlés randomisés et les études d'observation ont rapporté peu d'exemples de conséquences dommageables</u> consécutives à une notification passive ou assistée des partenaires dès lors qu'elle respecte le principe de consentement de la PVVIH.
- <u>La confidentialité et la participation volontaire sont des principes essentiels</u>, en particulier au cas où les partenaires ne se sont pas encore mutuellement révélés leur statut VIH.
- <u>Les responsables de la mise en œuvre de la notification doivent être conscients des conséquences dommageables possibles d'une divulgation du statut VIH, mais il faut aussi considérer les avantages du diagnostic précoce et de l'orientation vers le traitement des personnes séropositives pour le VIH.</u>
- <u>Ceux qui proposent des services de notification du partenaire doivent discuter des risques de conséquences dommageables avec les personnes recevant un diagnostic de VIH.</u> Si la sécurité de la personne n'est pas menacée, des services de notification volontaire du partenaire doivent être proposés.


Facteurs de succès de la notification

- Manière de discuter par les professionnels de santé des partenaires sexuels sans porter de jugement, à la manière de faciliter la divulgation mutuelle pour les couples et aux moyens de localiser les partenaires occasionnels.
- Offrir un choix. Différentes possibilités de notification du partenaire doivent être laissées aux PVVIH (qui doivent également pouvoir refuser cette possibilité).
- <u>Proposer périodiquement la notification des partenaires</u>. À partir du moment où l'infection à VIH est décelée, une notification assistée des partenaires peut être proposée à différents moments, tout au long du parcours du patient dans le système de santé.
- Ne pas pratiquer de notification obligatoire ou coercitive, éviter les attitudes et comportements qui stigmatisent et discriminent les personnes issues de groupes de population clés / personnes avec le VIH.



FICHE PRATIQUE N°3.7: LES MODALITES DE DISPENSATION ATLAS DANS LA PRATIQUE

1. Dépistage des cas index : distribution secondaire pour les partenaires des PVVIH




Important:

<u>La PVVIH n'est pas bénéficiaire de l'autotest</u> (elle connait son statut et risque si elle est sous ARV d'avoir un résultat faux négatif)

<u>Dans le cas d'une notification passive</u>, le professionnel de la santé pourra/devra suivre auprès de la PVVIH si son/ses partenaire.s a utilisé l'autotest lors d'une consultation ultérieure et s'assurer que le lien vers le test de confirmation est fait.

<u>Dans le cas d'une notification assistée / double</u>, le professionnel de la santé pourra suivre auprès de la PVVIH si son/ses partenaire.s a utilisé l'autotest lors d'une consultation ultérieure ou s'appuiera sur les réseaux communautaires existants.

2. Dépistage dans les consultations IST : distribution secondaire pour les partenaires des personnes diagnostiquées avec une IST mais aussi offre alternative pour le patient ayant une IST (distribution primaire)



Dans le cas où la personne présente à la consultation et diagnostiquée avec une IST ne désire pas faire le dépistage dans le centre, l'autotest peut lui être proposé afin qu'elle se dépiste chez elle (avec son/sa partenaire).

Concrètement, il y a la possibilité de donner 1 autotest pour le/la partenaire de la personne diagnostiquée avec une IST ou 2 autotests pour le/la partenaire et le/la patient.e



FICHE PRATIQUE N°3.8: IMPORTANCE ET DEFIS DU LIEN VERS LA CONFIRMATION ET L'ENTREE DANS LES SOINS

Bénéfices du lien vers la confirmation et l'entrée dans les soins pour la personne avec un résultat réactif

Ces bénéfices peuvent être mis en avant par les professionnels de la santé, éducateurs pairs et écoutants auprès de la personne pour promouvoir le test de confirmation et l'entrée dans les soins.

- La personne avec un résultat réactif est peut-être séropositive. <u>Un test supplémentaire est nécessaire pour confirmation</u>. Ne pas y recourir maintien la personne dans le **doute** et la **crainte** de son statut.
- La personne lorsque son test est confirmé :
 - ✓ Est alors <u>capable de prendre des décisions</u> éclairées sur sa vie
 - ✓ Bénéficie de <u>conseils</u> et de <u>soutien</u> émotionnel /psychosocial
 - ✓ Bénéficie d'un accompagnement pour accepter sa situation et en parler avec ses proches
 - ✓ A <u>accès au traitement ARV</u> qui améliore sa qualité de vie
 - ✓ <u>Réduit son risque de contaminer</u> d'autres personnes

Barrières existantes pour assurer l'entrée dans les soins dans le cadre de l'ADVIH et stratégies/outils pour les surmonter

Deux barrières principales pour promouvoir le lien vers le test de confirmation et l'entrée dans les soins après une auto dépistage réactif existent.

- Impossibilité d'apporter un conseil immédiat après le dépistage : dans le cas d'un auto dépistage du VIH réalisé par une personne seule à la maison, sauf si celle-ci a recours à la ligne téléphonique gratuite
- <u>Confrontations aux phénomènes de stigmatisation et discrimination</u> : ces barrières d'accès aux services de santé s'appliquent nécessairement puisque le test de confirmation devra se faire en centre de dépistage/santé.

Ces deux éléments devront être ainsi pris en compte lors de la dispensation de l'ADVIH par les professionnels de santé, les éducateurs par les pairs et les écoutants des lignes téléphoniques gratuites.

Comment prendre en compte ces barrières ?

- <u>Insister sur l'importance du lien vers le test de confirmation et les bénéficies pour la personne</u> : lors de la dispensation et en sensibilisant les distributeurs relais
- Adopter une attitude non stigmatisante / discriminante : au moment de la dispensation de l'autotest de dépistage du VIH
- Dispenser l'autotest de dépistage du VIH en respect des règles d'écoute active et de conseil
- <u>Promouvoir les outils à disposition</u> (notice, brochure complémentaire, vidéo de démonstration) qui rappellent l'importance d'effectuer un test de confirmation
- Rappeler la liste de services disponibles : brochure complémentaire et site internet
- <u>Inviter la personne à appeler la ligne téléphonique</u> : les professionnels de santé et éducateurs pairs invitent ainsi la personne à se faire aider et accompagner.
- <u>Proposer à la personne, directement ou via les réseaux communautaires, de contacter les professionnels de santé et les pairs éducateurs</u> après le résultat s'il s'avère réactif



FICHE PRATIQUE N°3.9: PRINCIPES ET OBJECTIFS DU SUIVI ET EVALUATION DU PROJET ATLAS

Recherche à visée évaluation et intégration au système de santé

Recherche Evaluative sur l'impact

Volet « qualitatif »

Facteurs et impacts sociaux Populations clés et personnes vivant avec le VIH

Enquête téléphonique

Efficacité et impact ADVIH Usagers

Volet « coût »

Coût / Efficacité

Objectif de mise à l'échelle

Collecte de données performance et impact

Comparaison données dépistage et entrée dans les soins

District du projet ATLAS / District sans projet Collecte de données de routine S&E dispensation

Données « qualitatives »

Entretiens réguliers, retour sur la pratique et évolutions des dispensations Professionnels de santé, pairs éducateurs

Réalisée par les professionnels de santé, pairs éducateurs et les écoutants hotline.

Seules les données liées à la dispensation sont demandées (et non les résultats des autotests)

Dans le cadre du projet ATLAS plusieurs méthodes de suivi et d'évaluation de la performance et de l'impact du projet ont été développées :

- La recherche à visée évaluative qui comprend plusieurs volets :
 - <u>2 volets qualitatifs mesurant les facteurs et les impacts sociaux</u> auprès des populations clés et les personnes vivant avec le VIH
 - <u>1 Enquête téléphonique qui visera à mesure l'efficacité et l'impact</u> de l'ADVIH auprès des usagères et usagers
 - <u>1 Volet mesurant les coûts et modélisant le coût efficacité</u> de l'introduction de l'ADVIH afin de permettre à chaque pays d'envisager la mise à l'échelle.
- La collecte de données permettant d'évaluer indirectement la performance et l'impact du projet
- La collecte de données de routine permettant de <u>suivre</u> et <u>évaluer</u> la dispensation de l'ADVIH et ainsi d'améliorer en continu les stratégies déployées.

C'est dans ce dernier cas que des outils ont été spécifiquement développés pour les professionnels de la santé, les éducateurs pairs et les écoutants des lignes téléphoniques gratuites. Seules les données liées à la dispensation sont demandées (et non les résultats des autotests).



FICHE PRATIQUE N°3.10: OUTILS DE SUIVI ET EVALUATION

1. Pour les consultations IST



Consultations IST



Registre habituel Données Agrégées mensuellement dans la fiche



Pour les consultations IST, dans des consultations ouvertes à la population générale, les données seront collectées dans les registres de consultation habituels par les professionnels de la santé et - Nombre de personnes reçues en consultation et/ou ayant bénéficié de soins/traitement pour IST selon l'âge et le sexe - Nombre de personnes ayant effectué un TDR VIH volontairement ou sur proposition du prestataire - Nombre de personnes ayant effectué un TDR VIH sur demande ou sur proposition du prestataire - Nombre de personnes ayant effectué un autotest VIH sur demande ou sur proposition du prestataire	Quand	Quoi	Support
agrégées mensuellement dans - Nombre de kits d'ADVIH dispensés par le prestataire aux personnes ayant une l'outil/rapport IST par classe d'âge et par sexe	des consultations ouvertes à la population générale, les données seront collectées dans les registres de consultation habituels par les professionnels de la santé et agrégées mensuellement dans	soins/traitement pour IST selon l'âge et le sexe Nombre de personnes ayant effectué un TDR VIH volontairement ou sur proposition du prestataire Nombre de personnes ayant reçu un autotest VIH sur demande ou sur proposition du prestataire Nombre de kits d'ADVIH dispensés par le prestataire aux personnes ayant une	« Consultations

2. Pour les consultations PVVIH



Consultations PVVIH



Registre habituel Données agrégées mensuellement dans la fiche



Quand	Quoi	Support
Pour les consultations PVVIH dans des centres ouverts à la	- Nombre de personnes vivant avec le VIH sous ARV	
population générale ou dans des centres dédiés aux	suivies dans la structure selon l'âge et le sexe	
populations clés, les données seront collectées dans les	- Nombre de kits d'ADVIH dispensés aux Personnes	Fiche « Sites ARV »
registres de consultation habituels par les professionnels de	vivant avec le VIH sous ARV suivies dans la structure	
la santé et agrégées mensuellement dans l'outil/rapport	par âge et par sexe	

3. Pour les consultations IST/PVVIH dédiées aux populations clés (stratégies fixes)



Consultations IST dédiées aux populations cibles



Registre habituel Données agrégées mensuellement dans la fiche



Fiche « Stratégie fixe HSH » Fiche « Stratégie fixe TS » Fiche « Stratégie fixe UD » Fiche « SSSU »

Quand	Quoi	Support
Pour les consultations IST/PVVIH dédiées aux	Pour les HSH: Nombre de HSH reçus en consultation IST au niveau de la clinique selon l'âge Nombre de kits d'ADVIH dispensés aux HSH lors des consultations IST selon l'âge	Fiche « Stratégie fixe HSH »
populations clés (stratégies fixes) les données seront collectées dans les registres	Pour les Travailleuses du sexe : Nombre de TS reçus en consultation IST au niveau de la clinique selon l'âge Nombre de kits d'ADVIH dispensés aux TS lors des consultations IST selon l'âge	Fiche « Stratégie fixe TS »
de consultation habituels par les professionnels de la santé et agrégées	Pour les usagères et usagers de drogues : - Nombre de TS reçus en consultation IST au niveau de la clinique selon l'âge - Nombre de kits d'ADVIH dispensés aux TS lors des consultations IST selon l'âge	Fiche « Stratégie fixe UD »
mensuellement dans l'outil/rapport	Pour les jeunes au sein des SSSU (Côte d'Ivoire): Nombre d'UD/jeunes bénéficiant de soins, soutien ou traitement selon l'âge et le sexe Nombre de kits d'ADVIH dispensés aux UD/jeunes suivis par classe d'âge et par sexe	Fiche « SSSU »



Le projet ATLAS est mis en œuvre au Sénégal en partenariat avec le Ministère de la Santé et de l'Action Sociale et le Conseil National de Lutte contre le Sida.





Ce document peut être utilisé ou reproduit sous réserve de mentionner la source, et uniquement pour un usage non commercial.



